

1. Thời vụ

- Vụ Xuân: Gieo từ cuối tháng 2 đến tháng 3, thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9. Nếu gieo muộn, cây sẽ ra hoa, nhưng năng suất giảm dần.

- Vụ Thu-ông: Gieo từ cuối tháng 7 đến tháng 8, thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 1, cuối tháng 2.

2. Giống

Các giống hiện đang có sẵn là:

+ Giống địa phương do Viện Khoa học nông nghiệp tuyển chọn (Phân viện miền Nam), giống DB1 do Viện nghiên cứu Rau - Quả chọn lọc.

+ Giống nhập nội từ Thái Lan và Đài Loan.

- > Năng suất giống cần từ 18-22 kg/ha.

3. Làm đất

Chọn loại đất cát pha, thịt nhẹ, hoặc đất thịt trung bình, pH từ 5,5-6,8. Đất phải bằng phẳng, đủ tưới và tiêu nước.

Đất cần cày ba lượt, làm sạch cỏ trước khi gieo.

Lên luống 1,4-1,5m, mật độ luống 1,1-1,2m, chiều cao luống 25-30cm.

4. Mật độ, khoảng cách

Gieo 2 hàng, khoảng cách 70-80cm x 40cm/cây; mật độ từ 3,2-3,5 cây/ha.

5. Phân bón

Tuyệt đối không dùng phân chung tỉ, phân bắc tỉ và nước phân tỉ bón học tỉ.

5.1. Lượng phân chung:

Bón lót 15-20 tấn/ha, cũng có thể dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chôn bừa thay thế phân chung vì lượng phân bón 1/3 lượng phân chung.

5.2. Lượng phân và phương pháp bón phân hoá học

- Bón thúc: chia 5 lần.

+ Lần 1: cây có 4-5 lá thật.

+ Lần 2: bắt đầu ra hoa.

+ Lần 3: thu hoạch 1.

Sau đó, cách 2 lần hái lại thì bón thúc (dùng nước phân mục tưới đẫm cây).

- Làm cỏ, xịt thuốc 2 lần và kết hợp với bón thúc lần 1 và lần 2.

- Có thể dùng các dạng nitrat amôn hoặc sulfat amôn thay cho urê, clorua kali thay cho kali sunphat hoặc dùng các dạng phân hỗn hợp, phức hợp NPK bón vì lượng nguyên chất tăng dần. Ngoài biện pháp bón vào đất, có thể phun qua lá các dung dịch dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng theo hướng dẫn sử dụng của hãng sản

xut.

- Ch c thu hoch qu sau khi bón phân ít nht 7-10 ngày.

6. Tỉ nc

S dng ngun nc tỉ sch (nc sông, nc ging khoan). Tuyt i không s dng ngun nc thì b ô nhim, nc thì t bnh vin.

Cn thng xuyên gi m t 80-85% trong sut quá trình thu hái qu.

7. Phòng tr sâu bnh

* *Sâu hi*

+ Sâu c qu (*Maruca testulalis*): Phi phòng tr sm khi sâu cha c vào qu hoc mi chm c vào qu, s dng các thuc Sherpa 20 EC, Cyperan 25 EC, Sumicidin 10 EC.

+ Rp (*Aphis* sp.): Phòng tr bng thuc Karate 2,5 EC hoc Sherpa 20 EC.

* *Bnh hi*

+ Bnh thán th (*Colletotrichum* sp.): Phòng tr bng các loi thuc Benlat 10 WP, Score 250 EC, Ridomil MZ 72 WWP, Derosal 50 SC.

+ Bnh g st (*Ugomyces* sp): Phòng tr bng thuc Anvil 5 SC, Rovral 50 WWP, Score 250 EC.

Các loi thuc khi s dng phi theo hng dn trên nhãn bao bì ca tng loi thuc, thì gian cách ly ít nht là 10 ngày.

8. Thu hoch

- Thu qu úng tiêu chun thng phm: dài 7-10cm (sau n hoa 7-8 ngày).

- Trong quá trình thu hoch, loi b qu nh, qu sâu, không t cht lng sn phm.

Nu thc hin y quy trình này, nng sut có th t t 18,0-26,0 tn qu tí/ha.

<http://agriviet.com>